

先生各位

検査受託中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定委託先より、現行採取容器が世界的な供給不足により供給が中断し、また、容器の供給再開までにはかなりの時間を要するため、やむを得ず検査の受託を中止する旨の連絡がございました。

弊社といたしましても、急遽ではございますが、検査受託を中止させていただきたくご案内いたします。

何卒事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■受託中止日 2020年 12月 28日（月）ご依頼分をもって受託中止

■受託中止項目

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
58	2475 6B610	淋菌核酸同定[SDA](咽頭ぬぐい液)	長期にわたる採取容器供給中断のため
	2474 5E021	クラミジア・トラコマチス核酸同定[SDA](咽頭ぬぐい液)	

※SDA用採取容器につきましては、お手数ですが12月28日までに当社までご返却いただきますようお願いいたします。


■代替項目

案内書掲載頁	コード	検査項目名称	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	採取 容器	保存	検査方法	基準値	所要日数	備考
58	2419 6B610	淋菌核酸同定	微生物 204	うがい液	56	室温	リアルタイム PCR	(-)	2~3	* 00
	2440 5E021	クラミジア・トラコマチス 核酸同定	微生物 198							

※ご出検の際は、必ず指定用器にてご提出ください。検体採取方法につきましては、総合検査案内152頁にも掲載しております。


うがい液検体の採取方法

※生理食塩水・うがい用コップ・滅菌スポイドは医療機関様でご用意下さい




うがいの仕方

生理食塩水(日局方など)をコップに15~20mL入れる
生理食塩水15~20mLを口に含み、顔を上に向けて10~20秒間、勢いよく「ガラガラ」とうがいをする
注)口に含んで吐き出した液とうがい用容器(うがい用コップ)に残した液を合わせてうがい液とします



うがい液全量とうがい用容器(うがい用コップ)に回収し、滅菌スポイド等で、専用容器に記載されている2つのラインの間に収まるようにうがい液を加える



専用容器の蓋をしっかりと閉め、5回転倒混和して下さい

・検体採取前の食事・うがい・歯磨き・ガムを噛むことなどは避けて下さい。

資料提供: ロンシュダイアグノスティックス

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。

先生各位

検査受託中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定委託先より、現行採取容器が世界的な供給不足により供給が中断し、また、容器の供給再開までにはかなりの時間を要するため、やむを得ず検査の受託を中止する旨の連絡がございました。

弊社といたしましても、急遽ではございますが、検査受託を中止させていただきたくご案内いたします。

何卒事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■受託中止日 2020年 12月 28日（月）ご依頼分をもって受託中止

■受託中止項目

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
58	2475 6B610	淋菌核酸同定〔SDA〕(咽頭ぬぐい液) 備考) 泌尿器・生殖器からの検体も検査可	長期にわたる採取容器供給中断のため
	2474 5E021	クラミジア・トラコマチス核酸同定〔SDA〕(咽頭ぬぐい液) 備考) 泌尿器・生殖器からの検体も検査可	

※SDA用採取容器につきましては、お手数ですが12月28日までに当社までご返却いただきますようお願いいたします。

■代替項目

案内書掲載頁	コード	検査項目名称	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	採取 容器	保存	検査方法	基準値	所要日数	備考
58	2436 6B610	淋菌核酸同定	微生物 204	頸管 ぬぐい液	33	室温	リアルタイム PCR	(-)	2~3	
	2419 6B610		微生物 204	うがい液	56					
	2435 5E021	クラミジア・トラコマチス 核酸同定	微生物 198	頸管 ぬぐい液	33					
	2440 5E021		微生物 198	うがい液	56					

※ご出検の際は、必ず指定用器にてご提出ください。検体採取方法につきましては、総合検査案内151・152頁に掲載しておりますのでご参照下さい。

※SDAご利用時に『咽頭ぬぐい液』を検査材料としてご利用されていた場合、代替検査においては『うがい液』をご利用ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。